

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ - CT

- *Pacient se dostaví na lačno (4 hod. před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit)*
- **Pokud se předpokládá aplikace jodové kontrastní látky (JKL), odesílající lékař zajistí**

POUČENÍ PACIENTA A JEHO SOUHLAS S PODÁNÍM JÓDOVANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY

Před aplikací JKL:

- *zajistíte dostatečnou hydrataci vyšetřované osoby p.o. nebo i.v. (obzvláště u starých osob a v teplých letních měsících)*
 - *4 hodiny před výkonem vyšetřovaný omezí perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (např. 100 ml/hod.), nepřijímá již žádnou pevnou stravu*
 - *pro prevenci kontrastní nefropatie je **NUTNÉ** znát aktuální hodnotu hladiny kreatininu v séru - **zajišťuje odesílající lékař***
 - ***odesílající lékař** odebere alergickou anamnézu (včetně podání JKL v minulosti)*
 - *u hospitalizovaných a ambulantních pacientů odesílající odd. zajistí periferní cévní přístup : CT angiografie - zelená braunyla (min. růžová) a šroubovací spojovací hadička, vše řádně dotáhnout,*
- CT vyšetření břicha - růžová braunyla, šroubovací spojovací hadička, vše řádně dotáhnout*
- *u pacientů mimo ONT zajistíme periferní cévní přístup na CT pracovišti*
 - *před CT vyšetřením NEPODÁVAT pacientům Dithiaden.*

Po aplikaci J KL:

- *po dobu alespoň 30 minut observujeme vyšetřovaného, případně jej předáme do péče zdravotnickému personálu*
- *zajistíte dostatečnou hydrataci vyšetřovaného po dobu 24 hodin po aplikaci JKL, ambulantní pacienty informujeme o nutnosti dostatečné hydratace v tomto období*

Detailní informace o podání JKL: Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek (J KL)

CT kolonografie:

Den před vyšetřením vynechte jídlo. Ke snídani a k obědu pouze tekutiny - např. čaj, kávu, ovocné šťávy, lehké polévky. K večeři nic nejezte, pijte jen čaj nebo vodu. V podvečer - někdy mezi 16 a 18 hodinou - začněte s přípravou:

Balení FORTRANSU obsahuje 4 sáčky. Každý sáček je třeba rozpustit v 1 litru vlažné vody a vypít co nejrychleji. Po vypití 2 litrů odchází konečným řídká stolice, po třech litrech obvykle jen voda. Odchází-li ještě voda zbarvená stolicí, vypijte i 4 sáček. Pokud nestačily ani 4 sáčky k vyprázdnění, upozorněte na to před vyšetřením lékaře.

- Místo FORTRANSU je možno použít i jiný přípravek - určí odesílající lékař (návody k použití na příbalovém letáku).

V den vyšetření přijít na lačno.

CT vyšetření kostí, kloubů, páteře: Bez přípravy

oddělení

Užívá - li pacient léky - normálně vzít bez omezení a zapít tekutinou